

Technika pobierania materiału do badania w kierunku SARS-CoV-2

WYMAZ Z GARDŁA

1. Głowę pacjenta delikatnie odchylić do tyłu.
2. Poprosić pacjenta o szerokie otwarcie jamy ustnej.
3. Dociśnij szpatułką język ku dołowi, aby uniknąć kontaminacji wymazu śliną.
4. Suchą, sterylną wymazówką energicznie potrząść tylną ścianę gardła (bez dotykania powierzchni jamy ustnej i języka).
5. Wymazówkę z pobranym materiałem umieścić w probówce z 2 ml soli fizjologicznej, szczelnie zamknąć i delikatnie zamieszać.



WYMAZ Z NOSOGARDZIELI

1. Przed pobraniem wymazu należy ustalić głębokość wprowadzenia wymazówki (optymalna głębokość jest równa zmierzonej odległości pomiędzy nasadą nosa a małżowiną uszną, a minimalna jest równa połowie tej odległości).
2. Głowę pacjenta odchylić delikatnie do tyłu.
3. Wymazówkę delikatnie wprowadzić przez otwór nosowy do jamy nosowo-gardłowej na właściwą głębokość.
4. Wymazówkę trzymać nieruchomo przez 2-3 sekundy, a następnie delikatnie obracać 2-3 razy wokół własnej osi.
5. Wymazówkę z pobranym materiałem umieścić w probówce z 2 ml soli fizjologicznej, szczelnie zamknąć i delikatnie zamieszać.

