


Zalecenia dotyczące postępowania w warunkach domowych dla pacjentów poddanych kwarantannie po narażeniu na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub izolacji domowej domowej z powodu podejrzenia lub potwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 niewymagającego hospitalizacji.

Pacjenci i ich rodziny powinny stosować się do poniższych zaleceń:

1. Pacjent powinien zostać w domu.
 - ★ Nie idź do pracy, szkoły. Unikaj miejsc publicznych.
 - ★ Nie korzystaj z transportu publicznego, taksówek.
2. Pacjent powinien być umieszczony w dobrze wentylowanym pokoju jednoosobowym (tj. z otwartymi oknami i otwartymi drzwiami). Członkowie ze wspólnego gospodarstwa domowego powinni przebywać w innym pokoju, a gdy jest to niemożliwe, powinni zachować odległość co najmniej 1 metra od chorego (np. spanie w oddzielnym łóżku).
3. Ograniczone poruszanie się pacjenta w domu. Zminimalizowanie przestrzeni współdzielonej z rodziną. Wspólne pomieszczenia jak – kuchnia, łazienka, powinny być dobrze wentylowane (np. otwieranie okien, drzwi).
4. Chorym powinna opiekować się wyłącznie jednego opiekuna (zdrowa, bez chorób przewlekłych czy upośledzonej odporności). Całkowity zakaz odwiedzin do czasu całkowitego wyzdrowienia chorego, całkowitego ustąpienia objawów lub do czasu zakończenia kwarantanny.
5. Konieczna HIGIENA RĄK po każdym kontakcie z pacjentem lub przedmiotami z jego bliskiego otoczenia.
Zaleca się myć ręce mydłem i wodą, używać jednorazowych ręczników papierowych do suszenia rąk, a jeśli są niedostępne, należy użyć czystych ręczników i wymienić gdy są mokre.

Jak skutecznie myć ręce?




**Całkowity czas:
30 sekund**

Nie zapomnij umyć tych obszarów:



6. Osoba poddawana kwarantannie lub izolacji powinna używać maseczki ochronnej zawsze, gdy może znaleźć się w bliskim otoczeniu innych osób (w odległości < 2m, a optymalnie zawsze, gdy przebywa z kimś w tym samym pomieszczeniu) aby zatrzymać wydzieliny oddechowe (np. kichanie, katar, kaszel). Maseczka powinna być ściśle dopasowana do twarzy. Osoby, które nie tolerują maseczki, powinny stosować rygorystyczną higienę dróg oddechowych – tzn. podczas kaszlu i kichania usta i nos przykryte jednorazową chusteczką papierową; użyte materiały należy wyrzucić i natychmiast przeprowadzić higienę rąk. W przypadku chusteczek materiałowych należy je wyprać po użyciu – w wodzie ze zwykłym detergentem lub mydłem. Osoby ze wspólnego gospodarstwa domowego/opiekunowie powinni nosić ściśle dopasowaną maseczkę ochronną, gdy opiekują się, znajdują w tym samym pomieszczeniu co pacjent, także wtedy gdy pacjent ma założoną maseczkę.
7. Maska powinna być ściśle dopasowana do twarzy, zakrywać usta i nos, szczególnie należy zwrócić uwagę na dopasowanie maski w okolicy nasady nosa
8. Maski nie należy dotykać podczas użytkowania.
Maska powinna być wymieniana od razu, gdy stanie się mokra lub zabrudzona wydzielinami. Zmiana maski powinna się odbyć za pomocą odpowiedniej techniki:



9. Po zmianie maseczki natychmiast umyj ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj preparatem zawierającym alkohol.
10. W przypadku kichania, kaszlu zasłaniaj twarz ramieniem (zgięcie łokciowe). Nie zakrywaj ust dłonią.
11. Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami ustrojowymi chorego, szczególnie wydzielinami oddechowymi, stolcem, moczem i odpadami zabrudzonymi wydzielinami lub wydaliniami. Wszelkie niezbędne czynności należy wykonywać w rękawiczkach ochronnych. Każdorazowo przed i po zdjęciu rękawiczek należy przeprowadzić higienę rąk.
12. Nie używaj ponownie masek ani rękawiczek !
13. Przedmioty codziennego użytkowania jak sztućce, naczynia, powinny być dedykowane dla pacjenta, a ich ponowne użycie możliwe tylko po umyciu w zwykle stosowanym w domu detergencie lub wodzie z mydłem lub w zmywarce do naczyń.
14. Powierzchnie przedmiotów z bezpośredniego kontaktu z chorym (np. nocne szafki, ramy łóżka, klamki, włączniki, uchwyty szafek) powinny być codziennie myte i dezynfekowane. Mycie – woda z mydłem lub zwykłym domowym detergentem. Następnie dezynfekcja domowym środkiem dezynfekującym (zawierający 0,5% podchlorynu sodu – roztworem w proporcji 1 część środka dezynfekującego i 9 części wody). Jeśli powierzchnia podlegająca dezynfekcji może ulec zniszczeniu pod wpływem chloru można użyć alkoholu o stężeniu co najmniej 60%.
15. Łazienka i toaleta powinny być myte i dezynfekowane raz dziennie.
Mycie - zwykle domowe mydło lub detergent.
Dezynfekcja - domowy środek dezynfekujący zawierający 0,5% podchloryn sodu.
16. Odzież pacjenta, bielizna, pościel, ręczniki przeznaczone do prania powinny być umieszczone w szczelnym worku/torbie, zanim zostaną poddane praniu.
Pranie powinno się odbyć w temp. 60-90°C z zastosowaniem domowego detergentu, a następnie winno być dokładnie wysuszone.
17. Rękawice, maski i inne odpady powinny być umieszczone w koszu na śmieci z pokrywką.
Kosz należy umieścić w pokoju, w którym znajduje się pacjent.
18. Należy unikać innych rodzajów narażenia na skażone przedmioty z bezpośredniego otoczenia pacjenta (np. nie używaj wspólnie szczoteczki do zębów, papierosów).

Osoby, u których w ciągu 14 dni samoobserwacji/kwarantanny wystąpią objawy – gorączka, kaszel, duszność lub objawy łagodnej infekcji się nasilą, powinny bezzwłocznie skontaktować się z Sanepidem lub Oddziałem Chorób Zakaźnych.

Zalecany jest kontakt telefoniczny (pozwoli to na przekazanie istotnych wskazówek odnośnie środków ochrony, transportu, z ewentualnym zapewnieniem odpowiedniego transportu medycznego, a także zaplanowanie i organizację pracy w placówce medycznej).

WAŻNE TELEFONY:

- Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna we Wrocławiu, ul. Składowa 1/3:
71 361 46 91 lub 92 / 693 900 908 / 603 720 579
- Infolinia NFZ:
800 190 590
- Infolinia Oddziałów Chorób Zakaźnych WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5:
519 338 486
- Główny Inspektorat Sanitarny – wiarygodne informacje i aktualności odnośnie sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem SARS-CoV-2:
www.gis.gov.pl